

癌化学療法レジメン

氏名: \_\_\_\_\_  
 ID: \_\_\_\_\_  
 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

プロトコール名 **DBd療法(ダラキューロ:4~8クール目)**

対象疾患 再発または難治性の多発性骨髄腫

診療科 血液内科

施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
<b>day1</b>					
①	カロナー	1000mg(5錠)			ダラキューロ開始の1時間前から内服
	レナデックス	20mg(5錠)			
	d-クロルフェニラミ	2mg/錠(1錠)			
②	ダラキューロ	15mL/body			皮下注(特記事項参照)
③	ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>		1Vあたり 生食1.2mLに溶解	皮下注
<b>day2,5,9,12</b>					
①	レナデックス	20mg(5錠)			朝食後
<b>day4,8,11</b>					
①	レナデックス	20mg(5錠)			朝食後
②	ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>		1Vあたり 生食1.2mLに溶解	皮下注

2 投与方法の図式(day1)

3 投与スケジュール

1クール21日間。ダラキューロをday1に、ボルテゾミブをday1,4,8,11に  
 レナデックスをday1,2,4,5,8,9,11,12に行う。

4 特記事項

・ダラキューロとボルテゾミブは10分間あけること
・ダラキューロは臍から左又は右に15mLを3~5分かけて投与すること
・ダラキューロは間接クームス試験への干渉が認められることがある。