

癌化学療法レジメン

氏名: \_\_\_\_\_

ID: \_\_\_\_\_


体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

レジメン名 **Kd療法(週2回投与・2コース目以降用)**  
 対象疾患 再発又は難治性の多発性骨髄腫  
 診療科 血液内科  
 施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

| 投与薬剤名                   | 投与量                 | 投与可能量(mg) | 溶解、希釈液          | 投与方法                             |
|-------------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|
| <b>day1,2,8,9,15,16</b> |                     |           |                 |                                  |
| ① 生食                    | 250mL               |           |                 | 1時間かけて                           |
| ② 5%ブドウ糖                | 100mL               |           |                 | 血管確保とフラッシュ                       |
| ③ カイプロリス                | 56mg/m <sup>2</sup> |           | 5%ブドウ糖<br>100mL | 30分かけて(総量100mL)<br>(溶解方法は特記事項参照) |
| ④ 生食                    | 250mL               |           |                 | 1時間かけて                           |
| レナデックス                  | 20mg/day            |           |                 | 朝食後                              |
| <b>day22,23</b>         |                     |           |                 |                                  |
| レナデックス                  | 20mg/day            |           |                 | 朝食後                              |

2 投与方法の図式



3 投与スケジュール

1クール28日間。

4 特記事項

- ・ カイプロリスは10mg/Vは5mL、40mg/Vは20mLの注射用水で溶解し5%ブドウ糖で希釈する。
- ・ カイプロリスは体表面積が2.2m<sup>2</sup>をこえる場合はすべて2.2m<sup>2</sup>とする。