

癌化学療法プロトコール

プロトコール名 **R-Bendamustine**
 対象疾患 再発または難治性のB細胞悪性リンパ腫・マントル細胞リンパ腫
 診療科 血液内科
 施用者 _____

氏名: _____
 ID: _____
 体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
day1					
	セレスタミン	1錠内服			投与30分前に内服、
	カロナール	2錠内服			
①	生食	500mL			血管確保とフラッシュ用
②	リツキシマブ	375mg/m ²		生食で10倍希釈	特記事項参照
day2, 3					
①	生食	500mL			血管確保とフラッシュ用
②	グラニセトロン	3mg/50mL (1袋)		混注	15分点滴
	デキサート	6.6mg/2mL (2A)			
③	ベンダムスチン	90mg/m ²		生食500mL	2時間点滴(総量500mL)

2 投与方法の図式

時間 (hour)	1	2	3	4	5
day1					
①セレスタミンなど	↓				
②生食	→	→	→	→	→
③リツキシマブ	→	→	→	→	→
day2,3					
①生食	→	→	→	→	→
②グラニセトロン	→	→	→	→	→
③ベンダムスチン	→	→	→	→	→

3 投与スケジュール

1クール28日間。リツキシマブは1日目、ベンダムスチンは2・3日目に施行する。

4 特記事項

※ リツキシマブの初回は50mL/hで1時間、100mL/hで1時間、残量を200mL/hで点滴を行う。
 ※ 2回目以降は医師の判断において、100mL/h以上から開始できる。