

癌化学療法プロトコール

氏名: \_\_\_\_\_  
 ID: \_\_\_\_\_  
 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

プロトコール名 **リツキシマブ**  
 対象疾患 CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫  
 診療科 血液内科  
 施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量 (mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	生食	1000mL			血管確保とフラッシュ
②	セレスタミン	1錠			リツキシマブ投与の30分前に内服
	アセトアミノフェン	2錠			
③	リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>		生食で10倍希釈	特記事項参照

2 投与方法の図式

時間 (hour)	1	2	3	4	5
①生食	▶				
②セレスタミンなど					
③リツキシマブ	▶				

3 投与スケジュール

1週間毎に行い。最大投与回数は8回とする。

4 特記事項

※ リツキシマブの初回は50mL/hで1時間、100mL/hで1時間、残量を200mL/hで点滴を行う。  
 2回目以降は医師の判断において、100mL/h以上から開始できる。

- ・ リツキシマブ点滴時は、30分毎にバイタルを確認する。
- ・