

がん化学療法レジメン

レジメン名 **CBDCA/PTX/BV**
 対象疾患 **扁平上皮がんを除く非小細胞肺癌**
 診療科 **呼吸器内科**
 施用者 _____

氏名: _____
 ID: _____
 体表面積: _____ m² 体重: _____ kg
 24h-Ccr: _____ mL/min

↑
 カルボプラチンの投与可能量算出のため
 クレアチニンクリアランスの24時間値を入力してください。

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	生食	500mL		生食500mL	血管確保とフラッシュ
②	プロイメンド	150mg/V		生食100mL	30分で点滴静注
③	グラニセロン バッグ	3mg/50mL (1袋)		混注	15分で点滴静注
	デキサート	16.5mg/5mL (5A)			
	ポララミン	5mg/mL (1A)			
	ファモチジン	20mg /20mL(1A)			
④	パクリタキセル	200mg/m ²		生食500mL	3時間で点滴静注
⑤	カルボプラチン	6[AUC] × (Ccr 24hr値 + 25)		生食250mL	1時間で点滴静注
⑥	ベバシズマブ	15mg/kg		生食100mL	特記事項参照。 総量100mLで調製

2 投与方法の図式

時間 (hour)	0	2	4	6	8	10
①生食	→					
②プロイメンド	→					
③グラニセロンなど	→					
④パクリタキセル		→				
⑤カルボプラチン			→			
⑥ベバシズマブ				→		

3 投与スケジュール

1クール21日間。1日目に点滴。

4 特記事項

- ・ ベバシズマブは初回90分かけて滴下。問題なければ2回目は60分で、以降30分まで短縮可能！
- ・ パクリタキセルはアルコールに過敏な方には慎重に投与。
- ・ パクリタキセルはnonDEHPのルートで点滴を行う。
- ・ パクリタキセル投与の際は投与速度を補正する。
- ・ パクリタキセルの投与にはインラインフィルター(0.22 μm以下)を使用すること。

