

癌化学療法レジメン

氏名: \_\_\_\_\_  
 ID: \_\_\_\_\_  
 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

レジメン名 **CBDCA/PTX/BV/アテゾリズマブ** 24h・Ccr: \_\_\_\_\_ ml/min  
 対象疾患 化学療法未治療の切除不能な進行・再発の ↑  
 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)カルボプラチンの投与可能量算出のため  
 診療科 \_\_\_\_\_ クレアチニンクリアランスの24時間値を入力してください  
 施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

①	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	生食	500mL			血管確保とフラッシュ
②	プロイメンド	150mg/V		生食100mL	30分で点滴
③	グラニセトロン バッグ	3mg/50mL(1袋)		混注	15分かけて
	デキサート	16.5mg/5mL(5A)			
	ファモチジン	20mg/20mL(1A)			
	ポララミン	5mg/1mL(1A)			
④	テセントリク	1200mg/body		生食250mL	特記事項参照
⑤	ベバシズマブ	15mg/kg		生食100mL	特記事項参照 総量100mLで調製
⑥	パクリタキセル	175mg/m <sup>2</sup>		生食500mL	3時間かけて
⑦	カルボプラチン	6(AUC) × (24・Ccr+25)		生食250mL	1時間かけて

2 投与方法の図式

時間 (hour)	0	2	4	6	8	10
①生食	→					
②プロイメンド	→					
③グラニセトロンなど	→					
④テセントリク	→					
⑤ベバシズマブ		→				
⑥パクリタキセル			→			
⑦カルボプラチン				→		

3 投与スケジュール  
1クール21日間。

4 特記事項

- ・ テセントリク、パクリタキセルはインラインフィルター(0.22μm以下)を使用。
- ・ テセントリクは初回60分で投与し忍容性が良好であれば2回目以降は30分で投与可能。
- ・ ベバシズマブは初回90分かけて投与。問題がなければ2回目60分、3回目30分に短縮可能。
- ・ パクリタキセルはアルコールに過敏な方には慎重に投与。
- ・ パクリタキセルはnonDEHPのルートで点滴を行う。
- ・ プロイメンド、パクリタキセル投与の際は投与速度を補正する。