

がん化学療法レジメン

レジメン名 **CBDCA/S1**
 対象疾患 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 施用者 _____

氏名: _____

ID: _____

体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

24h・Ccr: _____ mL/min

↑
 カルボプラチンの投与可能量算出のため
 クレアチニンクリアランスの24時間値を入力してください

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	生食	500mL			血管確保とフラッシュ
②	プロイメンド	150mg/V		生食100mL	30分かけて
③	グラニセロン バッグ	3mg/50mL (1袋)		混注	30分かけて
	デキサート	3.3mg/1mL (1A)			
④	カルボプラチン	AUC6 × (24h・Ccr+25)		生食500mL	2時間かけて
	TS1	80mg/m ²			1日2回 朝・夕食後 2週間

2 投与方法の図式

時間 (hour)	1	2	3	4	5
①生食	→				
②プロイメンド	→				
③グラニセロンなど	→				
④カルボプラチン	→				

3 投与スケジュール

1クール21日間。カルボプラチンは1日目に点滴を行う。TS1は1～14日目まで連日内服後に、1週間休薬。

4 特記事項

- ・ TS-1は1日目の夕食後から開始。
- ・
- ・

501.

