

癌化学療法レジメン

氏名: _____

ID: _____

体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

レジメン名 **DTX+Ramucirumab**
 対象疾患 非小細胞肺癌
 診療科 呼吸器内科
 施用者 _____

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	生食	500mL			血管確保とフラッシュ
②	グラニセトロン バッグ	3mg/50mL(1袋)		混注	15分かけて
	デキサート	6.6mg/2mL(2A)			
	ポララミン	5mg/1mL(1A)			
③	サイラムザ	10mg/kg		生食250mL	投与速度は特記事項参照(総量250mLで調
④	ドセタキセル	60mg/m ²		5%糖250mL	1時間かけて

2 投与方法の図式

時間 (hour)		1	2	3	4	5
①生食			→			
②デキサートなど	→					
③サイラムザ		→				
④ドセタキセル			→			

3 投与スケジュール

1クール21日間。

4 特記事項

- ・ サイラムザは0.22μmのインラインフィルターを使用
- ・ サイラムザは初回60分で投与し忍容性が良好であれば2回目以降は30分で投与可能。
- ・ ドセタキセルを投与の際は投与速度を補正する。