

癌化学療法レジメン

氏名: _____
 ID: _____
 体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

レジメン名 **nab-PTX/BV**
 対象疾患 扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
 診療科 _____
 施用者 _____

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

| | 投与薬剤名 | 投与量 | 投与可能量(mg) | 溶解、希釈液 | 投与方法 |
|---------|---------|----------------------|-----------|---------|--------------------|
| day1 | | | | | |
| ① | 生食 | 250mL | | | 血管確保とフラッシュ |
| ② | グラニセトロン | 3mg/50mL(1袋) | | 混注 | 15分かけて |
| | デキサート | 6.6mg/2mL(2A) | | | |
| ③ | アブラキサン | 100mg/m ² | | 生食100mL | 30分かけて |
| ④ | ベバシズマブ | 15mg/kg | | 生食100mL | 特記事項参照(総量100mLで調製) |
| day8,15 | | | | | |
| ① | 生食 | 250mL | | | 血管確保とフラッシュ |
| ② | グラニセトロン | 3mg/50mL(1袋) | | 混注 | 15分かけて |
| | デキサート | 6.6mg/2mL(2A) | | | |
| ③ | アブラキサン | 100mg/m ² | | 生食100mL | 30分かけて |

2 投与方法の図式(day1)

| 時間 (hour) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
|------------|-----|---|-----|---|-----|
| ①生食 | | | | | → |
| ②グラニセトロンなど | → | | | | |
| ③アブラキサン | | → | | | |
| ④ベバシズマブ | | | | → | |

3 投与スケジュール
 1クール21日間

4 特記事項

- ・ アブラキサン投与時にインラインフィルターを使用しないこと。
- ・ アブラキサンは人血液由来成分を含有しているため、事前に説明し、同意を得ておく。
- ・ アブラキサンを投与する際は投与速度を補正する。
- ・ ベバシズマブは初回90分かけて点滴。忍容性があれば2回目は60分、3回目は30分で投与可能。