

がん化学療法レジメン

氏名: _____
 ID: _____
 体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

レジメン名 **PEM**
 対象疾患 非小細胞肺がん
 診療科 呼吸器内科
 施用者 _____

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
	葉酸	フォリアミン錠(5mg)を0.5mgに調製したものを使用			化学療法開始1週間前から、1日1回0.5mgを連日服用
	メチコパール注(500 μg/1mL)	1000 μg/2mL (2A)			化学療法開始1週間前に筋注以降9週間毎に筋注
①	生食	250mL			血管確保とフラッシュ
②	デキサート グラニセトロンバッグ	6.6mg/2mL (2A) 3mg/50mL (1袋)		混注	15分で点滴静注
③	アリムタ	500mg/m ²		生食100mL	10分で点滴静注

2 投与日の図式

時間 (hour)	0.5	1	1.5	2	2.5
①生食	→				
②グラニセトロンなど	→				
③アリムタ	→				

3 投与スケジュール

1クール21日間。1日目に点滴。

4 特記事項

- ・ 化学療法開始1週間前から、「葉酸の服用」と「ビタミンB12の筋注」を確認。
- ・ 腎毒性軽減のため、化学療法予定日の前後2日間(計5日間)NSAIDsなどの服用を中止する。
- ・

