

癌化学療法レジメン


氏名: \_\_\_\_\_  
 ID: \_\_\_\_\_  
 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

レジメン名 **PEM/BV**  
 対象疾患 扁平上皮がんを除く非小細胞がん  
 診療科 呼吸器内科  
 施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
葉酸	フオリアミン(5mg)を0.5mgに調製したものを使用			化学療法開始1週間前から1日1回0.5mgを連日服用
メチコパール注(500μg/1mL)	1000μg/2mL(2A)			化学療法開始1週間前に筋注以降9週間毎に筋注
① 生食	250mL			血管確保とフラッシュ
② デキサート	6.6mg/2mL(2A)		混注	15分かけて
② グラニセトロンバッグ	3mg/50mL(1袋)			
③ アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>		生食100mL	10分かけて
④ ベバシズマブ	15mg/kg		生食100mL	特記事項参照。総量100mLで調製

2 投与方法の図式



3 投与スケジュール  
 1クール21日間。

4 特記事項

- ・ 化学療法開始1週間前から、「葉酸の服用」と「ビタミンB12の筋注」を確認。
- ・ ベバシズマブは初回90分。問題なければ2回目60分、3回目以降は30分で投与可能
- ・