

癌化学療法レジメン

氏名: _____
 ID: _____
 体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

レジメン名 **ニボルマブ+イピリムマブ**
 対象疾患 化学療法未治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌
 オプジーボ+ヤーボイ+化学療法後の維持療法
 診療科 _____
 施用者 @USERNAME _____

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
day1				
① 生食	250mL			血管確保とフラッシュ
② オプジーボ	360mg/body		生食100ml	30分かけて(総量100mLで調製)
③ 生食	100mL			30分かけて
④ ヤーボイ	1mg/kg		生食50ml	30分かけて(特記事項参照)
day22				
① 生食	250mL			血管確保とフラッシュ
② オプジーボ	360mg/body		生食100ml	30分かけて(総量100mLで調製)

2 投与方法の図式 (day1)

時間 (hour)	1	2	3	4	5
① 生食	→				
② オプジーボ	→				
③ 生食	→				
④ ヤーボイ	→				

3 投与スケジュール

1クール42日間(最長2年間投与)

4 特記事項

- ・ オプジーボとヤーボイ投与の際にはインラインフィルター(0.2又は0.22 μg)を使用。
- ・ ヤーボイは最終濃度が1~4mg/mLで調製する。(体重25kg以下の患者には注意が必要)
- ・ ヤーボイを調製する際は生食50mLのボトルから30mL抜き取り残りの生食20mLに混注する。