

がん化学療法レジメン

氏名: \_\_\_\_\_  
 ID: \_\_\_\_\_  
 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

レジメン名 **5FU / I-LV**  
 対象疾患 胃がん  
 診療科 外科、消化器内科  
 施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	生食	250mL			血管確保とフラッシュ
②	グラニセロン バッグ	3mg/50mL(1袋)		混注	15分で点滴静注
	デキサート	3.3mg/1mL (1A)			
③	レボホリナート	250mg/m <sup>2</sup>		5%糖250mL	2時間で点滴静注
④	5FU	600mg/m <sup>2</sup>		生食50mL	5分で点滴静注(総量50mLで調製)

2 投与方法の図式

時間 (hour)	0.5	1	1.5	2	2.5
①生食					→
②グラニセロンなど	→				
③レボホリナート				→	
④5FU					↓

3 投与スケジュール

1クール8週間。1週間毎に6週間投与を繰り返し、2週間休薬する。

4 特記事項

. . .
-------------