

癌化学療法レジメン

氏名: \_\_\_\_\_  
 ID: \_\_\_\_\_  
 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

レジメン名 **SOX**  
 対象疾患 胃癌  
 診療科 \_\_\_\_\_  
 施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

投与薬剤名	投与量	投与可能量 (mg)	溶解、希釈液	投与方法
① 生食	250mL			血管確保とフラッシュ用
② イメンド	1セット (3日分)			L-OHPの1時間前に1日目を服用
③ グラニセトロン デキサート	3mg/50mL		混注	15分かけて
	3.3mg/mL(1A)			
④ オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>		5%糖液500mL	2時間かけて
TS1	1回40mg1日2回を朝夕食後14日間服用し7日間休薬			体表面積<1.25m <sup>2</sup>
	1回50mg1日2回を朝夕食後14日間服用し7日間休薬			1.25m <sup>2</sup> ≤ 体表面積<1.5m <sup>2</sup>
	1回60mg1日2回を朝夕食後14日間服用し7日間休薬			1.5m <sup>2</sup> ≤ 体表面積

2 投与方法の図式

時間 (hour)	1	2	3	4	5
① 生食	→				
② イメンド	↓				
③ グラニセトロンなど	→				
④ オキサリプラチン	→				

3 投与スケジュール  
 1クール21日間。

4 特記事項

・ TS-1は1日目夕食後から開始。  
 ・  
 ・