

がん化学療法レジメン

氏名: \_\_\_\_\_  
 ID: \_\_\_\_\_  
 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

レジメン名 **TS1+DTX**  
 対象疾患 胃がん  
 診療科 外科、消化器内科  
 施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	生食	250mL			血管確保とフラッシュ
②	グラニセロン バッグ	3mg/50mL (1袋)		混注	15分で点滴静注
	デキサート	6.6mg/2mL (2A)			
③	ドセタキセル	40mg/m <sup>2</sup>		5%糖250mL	1時間で点滴静注
	TS1	80mg/m <sup>2</sup>		1日2回朝夕食後	2週間連続内服、1週間休薬

2 投与方法の図式

時間 (hour)	0.5	1	1.5	2	2.5
①生食	→				
②グラニセロンなど	→				
③ドセタキセル	→				

3 投与スケジュール

1クール21日間。ドセタキセルを1日目に投与。TS1は2週間内服し、1週間休薬。

4 特記事項

- ・ TS-1が1日目の夕食後から開始。
- ・ ドセタキセルを投与の際は投与速度を補正する。