

がん化学療法レジメン


氏名: _____
 ID: _____
 体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

レジメン名 **Weekly PTX**
 対象疾患 胃がん、乳がん
 診療科 外科、消化器内科
 施用者 _____

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	生食	250mL			血管確保とフラッシュ
②	ブフェロロ ン	3mg/50mL (1袋)		混注	15分で点滴静注
	デキサート	6.6mg/2mL (2A)			
	ファモチジン	20mg/20mL (1A)			
	ポララミン	5mg/1mL (1A)			
③	パクリタキセル	80mg/m ²		5%糖250mL	1時間で点滴静注

2 投与方法の図式



3 投与スケジュール

1クール28日間。1週間毎に点滴静注を行い。4週間目は休薬する。

4 特記事項

- ・ パクリタキセルはアルコールに過敏な方には慎重に投与。
- ・ パクリタキセルはnonDEHPのルートで点滴を行う。
- ・ パクリタキセルの投与にはインラインフィルター(0.22 μ m以下)を使用すること。
- ・ パクリタキセル投与の際は投与速度を補正する。