

癌化学療法レジメン

氏名: _____

ID: _____

体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

レジメン名
対象疾患
診療科
施用者


トラスツズマブ デルクステカン

がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	5%ブドウ糖	250mL			血管確保とフラッシュ用
②	イメンド	1セット			1日1回3日分エンハーツ投与1時間前に服用開始
③	アロキシ	0.75mg/50mL		混注	15分かけて
	デキサート	9.9mg/3mL(3A)			
④	エンハーツ	6.4mg/kg		5%ブドウ糖100mL	90分かけて 特記事項参照

2 投与方法の図式



3 投与スケジュール
1クール21日間。

4 特記事項

- ・ 1Vあたり注射用水5mLで溶解する(濃度は20mg/mL)。
- ・ 2回目以降の投与の際、忍容性が良好ならば、30分まで短縮可能
- ・ 0.2 μmのインラインフィルターを通して投与すること。
- ・ 室温での調製及び投与は4時間以内に終了すること。
- ・ 投与する際、遮光すること。