

癌化学療法レジメン

氏名: _____
 ID: _____
 体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

レジメン名 **トラスツズマブ/SOX**
 対象疾患 HER2陽性胃癌
 診療科 外科、消化器内科
 施用者 _____

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	イメンド	1セット(3日分)			L-OHP投与1時間以上前に1日目を服用
②	生食	250mL			血管確保とフラッシュ
③	アロキシバッグ	0.75mg/50mL(1袋)		混注	15分かけて
	デキサート	9.9mg/3mL(3A)			
④	トラスツズマブ	初回8mg/kg		生食250mL	特記事項参照
		2回目以降6mg/kg			
⑤	オキサリプラチン	100mg/m ²		5%糖液500mL	2時間かけて
	TS1	80mg/m ²		1日2回朝夕食後	2週間内服、1週休薬

2 投与方法の図式

時間 (hour)	1	2	3	4	5
①イメンド	↓				
②生食				→	
③アロキシなど	→				
④トラスツズマブ	→	→			
⑤オキサリプラチン		→	→	→	

3 投与スケジュール

1クール3週間。トラスツズマブ、L-OHPはday1、TS-1は14日間連日服用、1週間休薬。

4 特記事項

- ・ トラスツズマブは初回90分で投与。忍容性が良好であれば60分、その次は30分まで短縮可能。
- ・ トラスツズマブは注射用水(60mg:3mL、150mg:7.2mL)で溶解。溶解後濃度は21mg/mLとなる。
- ・ TS-1は1日目の夕食後から開始。
- ・