

がん化学療法プロトコール

氏名: _____
 ID: _____
 体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

プロトコール名 **SOX+ベバシズマブ**
 対象疾患 結腸・直腸がん
 診療科 外科、消化器内科
 施用者 _____

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
① イメンド	1セット(3日分)			L-OHP開始1時間以上前に1日目を服用
② 生食	250mL			血管確保とフラッシュ
③ ベバシズマブ	7.5mg/kg		生食 100mL	特記事項参照。
④ デキサート	6.6mg/2mL (2A)		混注	15分かけて点滴静注
④ グラニセトロン バッグ	3mg/50mL (1袋)			
⑤ オキサリプラチン	130mg/m ²		5%糖 500mL	2時間で点滴静注
TS1	80mg/m ²		1日2回 朝・夕	2週連日服用、1週間休薬

2 投与方法の図式

時間 (hour)	1	2	3	4	5
① イメンド	↓				
② 生食				→	
③ ベバシズマブ		→			
④ グラニセトロンなど		→			
⑤ オキサリプラチン			→		

3 投与スケジュール

1クール21日間。ベバシズマブとL-OHPは1日目に投与。TS1は14日間連日服用、7日間休薬。

4 特記事項

- ・ ベバシズマブは初回90分で投与。忍容性が良好であれば60分、その次は30分まで短縮可能。
- ・ TS-1は1日目の夕食後から開始。
- ・