

がん化学療法プロトコール

氏名: _____
 ID: _____
 体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

プロトコール名 **GEM/CDDP**
 対象疾患 胆道がん
 診療科 外科、消化器内科
 施用者 _____

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	イメンド	1セット(3日分)			1日目をCDDP開始1時間以上前に服用
②	生食	500mL			1時間で点滴。
③	生食	500mL			血管確保とフラッシュ用
④	グラニセトロン バッグ	3mg/50mL (1袋)		混注	15分で点滴。
	デキサート	6.6mg/2mL (2A)			
⑤	シスプラチン	25mg/m ²		生食500mL	2時間で点滴。(総量500mL)
⑥	ゲムシタビン	1000mg/m ²		5%ブドウ糖100mL	30分で点滴。

2 投与方法の図式

時間 (hour)	1	2	3	4	5
①イメンド	↓				
②生食	→				
③生食		→			
④グラニセトロンなど	→				
⑤シスプラチン		→			
⑥ゲムシタビン			→		

3 投与スケジュール

1クール21日間。1、8日目に点滴。

4 特記事項

- ・ 点滴治療当日は、飲水を励行すること。
- ・