

癌化学療法レジメン


氏名: \_\_\_\_\_  
 ID: \_\_\_\_\_  
 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

レジメン名 **ゲムシタビン+TS-1**  
 対象疾患 胆道癌  
 診療科 \_\_\_\_\_  
 施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
<b>day1、8</b>				
① 生食	250mL			血管確保とフラッシュ
② デキサート	6.6mg/2mL(2A)		生食50ml	15分かけて
③ ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>		生食100ml	30分かけて
④ TS1	1回40mg1日2回を朝夕食後14日間服用し7日間休薬		体表面積<1.25m <sup>2</sup>	
	1回50mg1日2回を朝夕食後14日間服用し7日間休薬		1.25m <sup>2</sup> ≤ 体表面積<1.5m <sup>2</sup>	
	1回60mg1日2回を朝夕食後14日間服用し7日間休薬		1.5m <sup>2</sup> ≤ 体表面積	

2 投与方法の図式



3 投与スケジュール  
 1クール21日間

4 特記事項

. . . .
------------------