

がん化学療法プロトコール

氏名: \_\_\_\_\_  
 ID: \_\_\_\_\_  
 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

プロトコール名 **EC療法**

対象疾患 乳がん

診療科

施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	イメンド	1セット (3日分)			エピルビシン投与60分前に、1日目を服用
②	生食	250mL			血管確保とフラッシュ
③	デキサート	9.9mg/3mL (3A)		混注	15分かけて点滴
	グラニセトロン バッグ	3mg/50mL (1袋)			
④	エピルビシン	90mg/m <sup>2</sup>		生食50mL	15分かけて点滴
⑤	エンドキサン	600mg/m <sup>2</sup>		生食100mL	30分かけて点滴

2 投与方法の図式

時間 (hour)	1	2	3	4	5
①イメンド	↓				
②生食	→				
③グラニセトロンなど	→				
④エピルビシン	→				
⑤エンドキサン	→				

3 投与スケジュール

1クール21日間。術後補助化学療法の場合は合計で4回行う。エピルビシン総投与量制限900mg/m<sup>2</sup>まで。

4 特記事項

<ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul>
---