

癌化学療法レジメン


氏名: \_\_\_\_\_  
 ID: \_\_\_\_\_  
 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

レジメン名 **トラスツズマブ デルクステカン**  
 対象疾患 化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能又は再発乳癌  
 診療科 化学療法歴のあるHER2低発現の手術不能又は再発乳癌  
 施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	5%ブドウ糖	250mL			血管確保とフラッシュ用
②	イメンド	1セット			1日1回3日分エンハーツ投与1時間前に服用開始
③	アロキシ	0.75mg/50mL		混注	15分かけて
	デキサート	9.9mg/3mL			
④	エンハーツ	5.4mg/kg		5%ブドウ糖100mL	90分かけて 特記事項参照

2 投与方法の図式



3 投与スケジュール  
 1クール21日間。

4 特記事項

- ・ 1Vあたり注射用水5mLで溶解する(濃度は20mg/mL)。
- ・ 2回目以降の投与の際、忍容性が良好ならば、30分まで短縮可能
- ・ 0.2 μmのインラインフィルターを通して投与すること。
- ・ 投与する際、遮光すること。
- ・ 室温での調製及び投与は4時間以内に終了すること。