

癌化学療法レジメン


氏名: _____
 ID: _____
 体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

レジメン名 **ペルツズマブ+トラスツズマブ+ハラヴェン**
 対象疾患 HER2陽性の手術不能又は再発乳癌
 診療科 _____
 施用者 _____

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
day1					
①	生食	250mL			血管確保とフラッシュ用
②	パージェタ	初回840mg/body 2回目以降420mg/body		生食250mL	60分かけて(特記事項参照)
③	トラスツズマブ	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg		生食250mL	90分かけて(特記事項参照)
④	デキサート	6.6mg/2mL(2A)		生食50mL	15分かけて
⑤	ハラヴェン	1.4mg/m ²		生食50mL	5分かけて
day8					
①	生食	100mL			血管確保とフラッシュ用
②	デキサート	6.6mg/2mL(2A)		生食50mL	15分かけて
③	ハラヴェン	1.4mg/m ²		生食50mL	5分かけて

2 投与方法の図式



3 投与スケジュール
 1クール21日間。

4 特記事項

- ・ パージェタの投与速度は初回が60分、2回目以降は忍容性があれば30分に短縮可能。
- ・ パージェタは前回投与日から6週間以上のときには、改めて初回投与量の840mgで投与を行う。
- ・ トラスツズマブは投与速度は初回が90分、2回目以降は忍容性があれば30分まで短縮可能。
- ・ トラスツズマブは投与予定日より1週間を超えた後に投与する際は、改めて8mg/kgで投与を行う