

癌化学療法プロトコール

プロトコール名 **GEM+CBDCA療法**
 対象疾患 尿路上皮癌
 診療科 泌尿器科
 施用者 _____

氏名: _____
 ID: _____
 体表面積: _____ m² 体重: _____ kg

24h・Ccr: _____ ml/min

↑
 カルボプラチンの投与可能量算出のため
 クレアチニンクリアランスの24時間値を入力してください

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
day1.8.15					
①	生食	250mL			血管確保とフラッシュ
②	デキサート	6.6mg/2mL(2A)		生食100mL	30分かけて
③	ゲムシタビン	1000mg/m ²		生食100mL	30分かけて
day2					
①	ヴィーンF	500mL			血管確保とフラッシュ
②	イメンド	1セット(3日分)			CBDCA投与1時間前に1日目を内服
③	グラニセトロン バッグ	3mg/50mL(1袋)		混注	15分かけて
	デキサート	6.6mg/2mL(2A)			
④	カルボプラチン	4(AUC) × (24・Ccr+25)		生食500mL	2時間かけて

2 投与方法の図式

時間 (hour)	1	2	3	4	5
1,8,15日目					
① 生食	→				
② デキサート	→				
③ ゲムシタビン	→				
2日目					
① ヴィーンF			→		
② イメンド	↓				
③ グラニセトロン	→				
④ カルボプラチン			→		

3 投与スケジュール

1クール28日間。GEMを1,8,15日目に点滴、CBDCAを2日目に点滴する。

4 特記事項

. . .
