

癌化学療法プロトコール

氏名: \_\_\_\_\_  
 ID: \_\_\_\_\_  
 体表面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> 体重: \_\_\_\_\_ kg

プロトコール名 **セツキシマブ+RT(初回)**  
 対象疾患 頭頸部がん  
 診療科 \_\_\_\_\_  
 施用者 \_\_\_\_\_

1 投与薬剤名、投与量、投与方法

	投与薬剤名	投与量	投与可能量(mg)	溶解、希釈液	投与方法
①	生食	250mL			血管確保とフラッシュ
②	デキサート	6.6mg/2mL(2A)		生食100mL	30分かけて点滴
	ボララミン	5mg/1mL(1A)			
③	アービタックス	400mg/m <sup>2</sup> (初回)		生食500mL	2時間かけて点滴(総量500mL)
		250mg/m <sup>2</sup> (2回目以降)		生食250mL	1時間かけて点滴(総量250mL)

2 投与方法の図式

時間 (hour)		1	2	3	4	5
①生食					→	
②デキサートなど	→					
③アービタックス		→				

3 投与スケジュール

1クール7日間。

4 特記事項

- ・ アービタックス投与終了後1時間後まで血管確保の生食は継続し、経過観察。
- ・ 放射線と併用すること